

<p style="text-align: center;">Indicații după rezecția apicală</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitați mișcările care tracționează buza (râs, fluierat, cântat), eforturile fizice mari, aplecarea bruscă a capului • Pentru a reduce umflătura ce apare în primele 2-3 zile țineți intermitent comprese cu apă rece sau gheață • Periați cu grijă dinții, dar nu atingeți firele de sutură. Din a doua zi clătiți cu ceai de mușețel sau soluții antiseptice (Parodontax, Kin, Listerina, etc) • Evitați alimentele dure și fierbinți • Dacă apar dureri, folosiți antialgicele uzuale dvs: algocalmin, aspirină, ibuprofen, ketonal (dacă nu aveți probleme gastrice), paracetamol, saridon, etc. • După 7-10 zile reveniți pentru scoaterea firelor • După 6 luni și la 1 an reveniți cu radiografii de control la dintele operat • Recomandări speciale: 	<p style="text-align: center;">Indicații după rezecția apicală</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitați mișcările care tracționează buza (râs, fluierat, cântat), eforturile fizice mari, aplecarea bruscă a capului • Pentru a reduce umflătura ce apare în primele 2-3 zile țineți intermitent comprese cu apă rece sau gheață • Periați cu grijă dinții, dar nu atingeți firele de sutură. Din a doua zi clătiți cu ceai de mușețel sau soluții antiseptice (Parodontax, Kin, Listerina, etc) • Evitați alimentele dure și fierbinți • Dacă apar dureri, folosiți antialgicele uzuale dvs: algocalmin, aspirină, ibuprofen, ketonal (dacă nu aveți probleme gastrice), paracetamol, saridon, etc. • După 7-10 zile reveniți pentru scoaterea firelor • După 6 luni și la 1 an reveniți cu radiografii de control la dintele operat • Recomandări speciale:
<p style="text-align: center;">Indicații după rezecția apicală</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitați mișcările care tracționează buza (râs, fluierat, cântat), eforturile fizice mari, aplecarea bruscă a capului • Pentru a reduce umflătura ce apare în primele 2-3 zile țineți intermitent comprese cu apă rece sau gheață • Periați cu grijă dinții, dar nu atingeți firele de sutură. Din a doua zi clătiți cu ceai de mușețel sau soluții antiseptice (Parodontax, Kin, Listerina, etc) • Evitați alimentele dure și fierbinți • Dacă apar dureri, folosiți antialgicele uzuale dvs: algocalmin, aspirină, ibuprofen, ketonal (dacă nu aveți probleme gastrice), paracetamol, saridon, etc. • După 7-10 zile reveniți pentru scoaterea firelor • După 6 luni și la 1 an reveniți cu radiografii de control la dintele operat • Recomandări speciale: 	<p style="text-align: center;">Indicații după rezecția apicală</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitați mișcările care tracționează buza (râs, fluierat, cântat), eforturile fizice mari, aplecarea bruscă a capului • Pentru a reduce umflătura ce apare în primele 2-3 zile țineți intermitent comprese cu apă rece sau gheață • Periați cu grijă dinții, dar nu atingeți firele de sutură. Din a doua zi clătiți cu ceai de mușețel sau soluții antiseptice (Parodontax, Kin, Listerina, etc) • Evitați alimentele dure și fierbinți • Dacă apar dureri, folosiți antialgicele uzuale dvs: algocalmin, aspirină, ibuprofen, ketonal (dacă nu aveți probleme gastrice), paracetamol, saridon, etc. • După 7-10 zile reveniți pentru scoaterea firelor • După 6 luni și la 1 an reveniți cu radiografii de control la dintele operat • Recomandări speciale: